

心臓カテーテル検査・治療を受けられる患者様へ

患者氏名:@PATIENTNAME

| 月日 | / | | / | | / | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 経過 | 入院日 | | カテーテル前 | | カテーテル後 | |
| 達成目標 | ◇検査治療に同意している ◇検査治療の準備ができる | | | | ◇出血、腰痛、胸痛の合併症がない ◇穿刺部位の安静が保てる | |
| 処置 | 穿刺部位の毛剃りをします | | | | 夕方、回診があります 圧迫の解除は検査・治療の方法によって異なります。 | |
| 薬剤 (点滴/内服) | 内服の内容を確認します 当日中止になる薬があるときが あります。 確認後お伝えします。 | | 午後の方は点滴が1本あります 糖尿病薬、抗凝固薬は当日のみ中止 利尿薬はカテーテル後に内服します | | 点滴 検査の方 カテ室で1本、帰室後もう1本 治療の方 翌日まで、または主治医の指示があるまで | |
| 検査 | | | ※前日にだいたいの開始時間をお伝え していますが、緊急カテーテルが入ったり、 前の方が長引いたりすると、開始時間が 遅れることがあります。 | | 治療の方 カテーテル後、心電図モニターをつけていただきます 検査の方 直後、1時間後、夕方に検温をします 治療の方 直後から1時間おきに3回、夕方、夜検温をします | |
| 活動 安静度 | 制限はありません | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・肘からの検査 1時間安静、その後歩行可 ・手首からの治療 1時間安静、1時間後歩行可 | |
| | <p>準備物 名前を記入してください</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: 45%;"> <p>入院セットを使用されない方 腕から・・特に準備物はありません。 鼠径から・・バスタオル1枚 必要時和式の寝巻き、 T字帯、薬のみを準備 してください。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: 45%;"> <p>入院セットを使用される方 腕から・・特に準備物はありません。 鼠径から・・必要時T字帯を 準備してください。</p> </div> </div> <p>※女性の方で腕から治療される方はオムツをご準備ください。</p> | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ソケイからの検査・治療 早くて3時間後ベッドに背をつけたまま起き上がれますが、 長いと6時間の安静になります。(寝返りもできません) また、翌日までの安静になる場合もあります。 詳しくは検査、治療終了後に説明させていただきます | |
| 食事 | 治療食 水分の制限はありません | | 午前開始 朝欠食 午後開始 朝軽食、昼欠食 | | 検査の方は1時間後、治療の方は2時間後に食事ができます ソケイからの検査・治療の方は寝たまま食べてください | |
| 清潔 | 毛剃り後、シャワーに入ります | | | | | |
| 排泄 | | | おしっこの管を入れさせて頂 く場合があります | | 安静中はベッド上排泄になります | |
| 在宅復帰支援計画 総合的な機能評価 | 入院、検査・治療の オリエンテーションをします | | | | 検査・治療中は家族の方に待機していただきます 主治医から結果の説明があります | |

※病名、入院期間等は現時点で考えられるものであり、治療・検査の過程で変わる場合があります