


お名前 @PATIENTNAME 様

本人・家族

| 月 日 | / | / |
|------------------------------|---|--|
| 経 過 | 手術当日(手術後) | 手術後1日 |
| 達成目標 | ◇血圧、脈拍、体温、酸素の値が安定する ◇安静に伴う痛みが軽減できる ◇夜間、入眠できる ◇ドレーンからの出血が少ない(ドレーンが入る場合) | |
| 治療・薬剤 | 点滴ルート(首の血管から入っています) 心電図 酸素吸入 (酸素の値が良く、口の管が抜けていればマスクによる酸素投与) 体外式ペースメーカー(首の血管から管が入っています) (不整脈がなければ外れます) 体温計(腹部と足の裏) ドレーン(体内にたまる血液や滲出液を体外に排出する管) ※ドレーンは入らない場合もあります | (酸素の値が良ければ鼻からの酸素に変わります) 体温が安定したら外れます |
| 検査 | 採血、レントゲン、心電図があります | 採血、レントゲン、心電図があります |
| 活動・安静度 | ベッドをを起こして座ることができます。(足の付け根に管がある場合は起こせません) | 痛みのコントロールができていれば、ベッドに腰をかけて座ることができます |
| 食事 | 手術当日は食事を食べることはできません | 医師の許可が出たら飲水から始めます。飲水ができれば食事が始まります。内服も再開します |
| 清潔 | 手術当日は手術着のまま過ごします | 身体を拭いて着替えます(体重測定も実施) |
| 排泄 | 手術中より尿道カテーテルが入ってきます (正確な尿量を把握する目的があります) | |
| 患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導 | 手術直後、医師より手術結果の説明があります。 手術後、痛みや吐き気がありましたらお知らせください。 一般病棟とは異なる環境や高齢である事、また、治療のため多くの管が入る事で、せん妄症状を起こす事があります。 安全に過ごして頂けるよう関わらせて頂きます。 | 一般病棟へ戻ります  |